

Таблица 2

Характер микрофлоры толстой кишки больных в состоянии ОАП на фоне коррекции БАД с пробиотическим действием,  $M \pm m$ 

показатели	Контрольная группа		1-е сутки		7-е сутки I группа		7-е сутки II группа	
	количество (lg)	частота (%)	количество (lg)	частота (%)	количество (lg)	частота (%)	количество (lg)	частота (%)
Бифидобактерии	7,5±0,32	100±0	6,35±0,17***	100±0	6,42±0,50	100±0	8,16±0,34**	100±0
Лактобактерии	4,6±0,34	100±0	3,08±0,18***	91,67± 0,22***	3,24±0,28	98,61± 0,13^^^	4,22±0,28*	100±0^^^
Бактероиды	6,23±0,40	79,17±0,08	6,16±0,18	83,16±0,10***	6,02±0,24	97,44±0,03^^^	7,04±0,34	93,75±0,04***^^^
Клостридии	0	0	3,38±0,33	19,20±0,18	3,13±0,04	10,11±0,19^^^	3,42±0,33	9,10±0,11^^^
Кишечная палочка общее количество	6,75±0,35	100±0	7,14±0,23	100±0	6,43±0,30	100±0	7,44±0,24	100±0
Гемолитическая кишечная палочка	9,63±0,20	4,17±0,04	7,46±0,39	19,20±0,15***	9,48±0,20*	15,10±0,07^^^	5,77±0,75**	3,13±0,04^^^
Лактозонегативная кишечная палочка	6,57±0,89	16,67±0,08	7,77±0,36	26,90±0,18**	7,23±0,36	14,10±0,07^	7,61±0,37	12,60±0,23^
Протей	0	0	1,08±0,81	10,92± 0,11	1,2±0,20	5,20±0,06^^^	0	0
Энтерококки	5,48±0,31	95,83±0,04	4,47±0,19**	59,95± 0,11***	4,12±0,30	87,18±0,06^^^	5,38±0,32*	96,88±0,03^^^
Стафилококки коагулазонегативные	3,05±0,62	12,5± 0,07	4,37±0,19*	27,72± 0,15*	3,66±0,24	30,15±0,08^^^	3,72±0,33	37,12±0,07^^^
Золотистый стафилококк	3,85± 0,92	4,17±0,04	4,34±0,58	10,26±0,05***	4,13±0,18	8,20±0,19^^^	3,49±0,31	7,14±0,14^^^
Грибы рода Кандида	3,79±0,46	25,03±0,09	2,43±0,43	1,50±0,03***	2,89±0,21	8,02±0,06^^^	4,22±0,57	7,01±0,09^^^

Примечание: различия достоверны по сравнению с контролем при \* -  $p < 0,05$ ; \*\* -  $p < 0,01$ ; при \*\*\* -  $p < 0,001$

по сравнению с 1 сут. при ^ -  $p < 0,05$ ; ^^ -  $p < 0,01$ ; при ^^ -  $p < 0,001$

